




俄罗斯联邦国家预算科学
机构《全俄罗斯大豆科
学中心 联邦科学研究所》

大豆品种目录

2026



目录

LASTOCHKA	2
TATIANA	3
BERING	4
LYANA	5
OLIMP	6
ALPETRA	7
LUCHISTAYA	8
APIS	9
GREY	10
VNIIS 18	11
ZOLOTINTZA	12
TOPAZ	13
CHARODEYKA	14
ZOLUSHKA	15
SENTYABRINKA	16
STATNAYA	17
ZHURAVUSHKA	18
KRUZHEVNITSA	19
NEVESTA	20
KUHANNA	21
LEBIODUSHKA	22
KITROSSA	23
PEPELINA	24
UMKA	25
ALIONA	26
BONUS	27
EVGENIA	28
NEGA 1	29
PERSONA	30
MK 100	31
GRAZIA	32
LAZURNAYA	33
LIDIA	34
GARMONIA	35
DAURIA	36
SONATA	37
SEMENYCH	38
ALMAGA	39
DYMKA	40



俄罗斯联邦国家预算
科学机构《“全俄罗
斯大豆科学中心”联
邦科学研究所》

LASTOCHKA



该品种于2025年已列入俄罗斯联邦国家育种
成果名录，适用于乌拉尔、东西伯利亚与远东
地区中；发明家为《全俄大豆研究所》联邦国
家预算科学机构联邦科学中心

品种特征

植物生长类型为亚有限结荚型。灌木为直立的，有紧凑形式的。大豆秆为直的，可形成1至4枝，短柔毛中等，颜色为棕褐色。叶子为三叶，宽大的，具有尖卵形。朵花为紫色的。花序为总状花序，秆中部节上有4至10朵花，顶总状花序上有13至18朵花。豆荚有略微弯曲的形状，中等短柔毛，基本上有2、3豆子。豆子有黄色，椭圆形，表面光滑；种脐为短而线状，颜色与豆子一样，中间有一个白色芽眼。最佳播种期为5月20日至6月10日。播种方法为窄行条播，宽行条播。播种定额为每公顷60万至65万颗能发芽的豆子。土壤中的 P_2O_5 含量为不少于40毫克/千克。

生长期	100至104天
植物高度	68至73厘米
下部豆荚安上高度	14至20厘米
1000颗豆子重量	191.9至225.7克
蛋白质含量	39.3至41.9%
植物油含量	19.0至20.5%
预计收获量	3.02吨/公顷

该品种与已知类似品种相比的优势

早熟的品种，耐倒伏，对有害生物具有复杂的抵抗力。该品种对细菌病（*Bacterium glycineum* Coerper）和真菌病，包括褐斑病（*Phyllosticta soyaecola* Massal）具有很强的抵抗力。对喙孢霉叶枯病（*Septoria glycines* Hemmi.）、尾孢菌病（*Cercospora kikuhii*）、根腐病根腐（*Fusarium*）的抵抗力也很强。霜霉病（*Peronospora manshurica* Naum.）的感染力较弱。在对该品种进行多年观察的过程中，没有发现环纹病菌（*Ascochyta sojaecola* Abramov）对叶片造成的损害——彻底没有。豆子处理应使用微生物肥料与钼酸铵溶液和生物制剂结合进行，在潮湿的年份，建议使用杀菌剂。该品种适用于种植食品及饲料的豆子。建议在活动积温为1800至2600°C的区域种植。

在气候条件不利的年份（过湿、干旱等）繁殖该品种豆子时，可能会出现豆子色素沉着呈不同深浅的棕色（褐色）的典型植物。色素沉着不会影响豆子的其它形态特征，也不是品种特征。



俄罗斯联邦国家预算
科学机构《“全俄罗
斯大豆科学中心”联
邦科学研究所》

TATIANA



该品种于2025年已列入俄罗斯联邦国家育种
成果名录，适用于乌拉尔与远东地区中；发
明家为《全俄大豆研究所》联邦国家预算科
学机构联邦科学中心

品种特征

生长期	106至108天
植物高度	72至85厘米
下部豆荚安上高度	14至16厘米
1000颗豆子重量	160.2至165.1克
蛋白质含量	38.6至41.4%
植物油含量	18.3至19.5%
预计收获量	3.51吨/公顷

植物生长类型为亚有限结荚型。灌木为直立的。大豆秆为直的，可形成1至3枝，短柔毛中等，颜色为火红色。叶子为三叶的，具有尖卵形。朵花为紫色的。花序为总状花序，一个节上有5至8朵花，顶总状花序上有17至22朵花。豆荚有火红棕色，略微弯曲的形状，有时候为直的形状，基本上具有2、3豆子。豆子有黄色，球形，表面光滑无光泽；种脐较短，呈椭圆形，颜色为浅棕色。最佳播种期为5月15日至5月30日。播种方法为窄行条播，宽行条播。播种定额为每公顷50万至55万颗能发芽的豆子。土壤中的 P_2O_5 含量为不少于40毫克/千克。

该品种与已知类似品种相比的优势

中熟的品种，耐倒伏，对病原体及害虫具有抵抗力。比标准Dauria大豆品种的收获量平均高出0.24吨/公顷。该品种对尾孢菌病（*Cercospora sojae* Hara）、褐斑病（*Phyllosticta soyaecola* Massal）及细菌病（*Bacterium glycineum* Coerper）具有很强的抵抗力；对喙孢霉叶枯病（*Septoria glycines* Hemmi）与根腐病根腐（*Fusarium*）也有抵抗力。在多年的研究中，发现了该品种受到露菌病（*Peronospora manshurica* Naum.）的轻微感染，叶子上没有发现环纹病菌（*Ascochyta sojaecola* Abramov）的出现。豆子处理应使用微生物肥料与钼酸铵溶液和生物制剂结合进行，在潮湿的年份，应使用杀菌剂。该品种适用于种植食品及饲料的豆子。建议在活动积温为2000至2800°C的区域种植。

在气候条件不利的年份（过湿、干旱等）繁殖该品种豆子时，可能会出现豆子色素沉着呈不同深浅的棕色（褐色）的典型植物。色素沉着不会影响豆子的其它形态特征，也不是品种特征。



俄罗斯联邦国家预算
科学机构《“全俄罗
斯大豆科学中心”联
邦科学研究所》

BERING



该品种于2025年已列入俄罗斯联邦国家育种成果名录，适用于中央黑土、中伏尔加河与远东地区中；发明家为《全俄大豆研究所》联邦国家预算科学机构联邦科学中心

品种特征

植物生长类型为亚有限结荚型。灌木为直立的。大豆秆为直的，可形成1至3长及短枝，短柔毛中等，颜色为棕褐色。叶子为三叶的，具有尖卵形，全缘叶。朵花为紫色的。花序为总状花序，主秆上节间总数为12至16个，一个节上有5至16朵花，顶总状花序上有10至23朵花。豆荚有略微弯曲的形状，中等短柔毛，基本上有2、3豆子。豆子有黄色，扁平状的椭圆形，表面光滑无光泽；种脐有中等大小，椭圆形，颜色与豆子一样。最佳播种期为5月10日至5月25日。播种方法为窄行条播，宽行条播。播种定额为每公顷50万至55万颗能发芽的豆子。土壤中的 P_2O_5 含量为不少于40毫克/千克。

生长期	106至111天
植物高度	78至88厘米
下部豆荚安上高度	14至18厘米
1000颗豆子重量	198.8至218.4克
蛋白质含量	38.5至40.8%
植物油含量	18.9至21.1%
预计收获量	3.76吨/公顷

该品种与已知类似品种相比的优势

中熟，高产品种，比标准Dauria大豆品种的收获量平均高出0.21吨/公顷，在豆子中积累相当高比例的蛋白质（比标准高出2.6%）。同时，单位面积的粗蛋白收获量比标准Dauria大豆品种的收获量高0.13吨/公顷或16.9%。按植物病理学评估的结果，确定Bering品种对该地区常见的主要大豆病虫害具有复杂的抵抗力。该品种对以下细菌性疾病具有很强的抵抗力：细菌病（*Bacterium glycineum* Coerper）；对以下真菌病具有很强的抵抗力：褐斑病（*Phyllosticta soyaecola* Massal）、喙孢霉叶枯病（*Septoria glycines* Hemmi.）、尾孢菌病（*Cercospora kikuhii*）、根腐病根腐（*Fusarium*）。在研究期间过程中，发现了露菌病（*Peronospora manshurica* Naum.）的轻微感染，该品种的叶子上没有发现环纹病菌（*Ascochyta sojaecola* Abramov）的出现。豆子处理应使用微生物肥料与钼酸铵溶液和生物制剂结合进行，在潮湿的年份，应使用杀菌剂。该品种适用于种植食品及饲料的豆子。建议在活动积温为2200至2800°C的区域种植。

在气候条件不利的年份（过湿、干旱等）繁殖该品种豆子时，可能会出现豆子色素沉着呈不同深浅的棕色（褐色）的典型植物。色素沉着不会影响豆子的其它形态特征，也不是品种特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”
联邦科学研究所》

LYANA



该品种于2024年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”联邦科学研究所》

品种鉴定

植物类型：亚有限结荚型。**植株：**直立型。**茎直立**，长出1到3个侧枝，中等短柔毛。**叶片：**叶卵形，顶端尖锐。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状，茎的中部形成最多3个花序组，每组有10到17朵花，顶端花序有13到23朵花。**豆荚颜色**为褐色，形状稍微弯曲，通常含有2到3粒豆子。**种子**呈黄色，椭圆形，表面光滑无光泽；种脐短而窄，与种子同色，带有白色芽眼。**最佳播种期：**从5月20日到6月10日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷60万到65万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	104到109天
植物的高度	73至95厘米
豆荚底部离地高度	17到20厘米
千粒重	201.7到224.3克
蛋白质含量	39.9到41.9%
油含量	18.6到20.9%
生产潜力	3.15吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

早熟、高产，种子产量比LIDIA标准大豆品种多出0.23吨/公顷。LYANA品种大豆植物对大豆灰星叶点菌（*Phyllosticta soyaecola* Massal）和细菌病（*Bacterium glycineum* Coerper）具有强抗性；对灰斑病（*Cercospora sojae* Hara）、褐纹病（*Septoria glycines* Hemmi）及根部镰刀菌（*Fusarium*）同样表现出抗性。在研究期间，该大豆品种对霜霉病（*Peronospora manshurica* Naum.）的侵染程度较低，且叶片上未发现环纹病菌（*Ascochyta sojaecola* Abramov）的表现。**种子处理方法：**使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂；湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为1800到2000°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算
科学机构《“全俄罗斯
大豆科学中心”联邦
科学研究所》

OLIMP



该品种于2024年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”联邦科学研究所》

品种鉴定

植物类型：亚有限结荚型。**植株：**直立紧凑。**茎直立**，长出1到2个侧枝，中等短柔毛，颜色为灰色。**叶片：**具有3片小叶，披针形。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状，茎的中部形成最多2个花序组，每组有6到13朵花，顶端的花序组有16到20朵花。**豆荚形状**稍微弯曲，通常含有的2到3粒豆子。**种子**呈黄色，形状为圆形近似球状，表面光滑；种脐呈椭圆形、短小、黄色。**最佳播种期：**从5月15日到6月01日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷50万到55万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	110到117天
植物的高度	82到89厘米
豆荚底部离地高度	17到19厘米
千粒重	172.0到188.0克
蛋白质含量	37.9到40.3%
油含量	18.8到20.3%
生产潜力	3.72吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟，对土壤湿度过高具有耐受性，相当不易倒伏。OLIMP大豆品种对细菌性病害，如大豆细菌病（*Bacterium glycineum* Coerper）和真菌性病害，如灰星叶点菌（*Phyllosticta soyaecola* Massal）表现出高度抗性；对褐纹病（*Septoria glycines* Hemmi）、灰斑病（*Cercospora kikuhii*）及根部镰刀菌（*Fusarium*）同样表现出抗性。霜霉病（*Peronospora manshurica* Naum.）的损害程度较低。在研究期间，该品种的叶片未受到环纹病菌（*Ascochyta sojaecola* Abramov）的侵害。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，既适用于食品，也可用作饲料。建议在年活动积温为1900到2600°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”
联邦科学研究所》

ALPETRA



该品种于2023年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”联邦科学研究所》

品种鉴定

植物类型：无限结荚型。**植株：**直立紧凑。**茎直立**，长出2到4个侧枝，中等短柔毛。**叶片**呈浅绿色，三出复叶，小叶呈椭圆形且尖锐。**花朵：**白色。**花序形式：**总状，茎的中部形成最多两个花序组，每组有5到9朵花，顶端的花序组有8到15朵花。**豆荚**颜色为褐色，形状稍微弯曲，中等的短毛绒度，通常含有2到3粒豆子。**种子**呈黄色，形状为扁圆形，表面光滑；带有短小的椭圆形，种脐颜色与种子相似，偶尔比种子稍微深。**最佳播种期：**从5月20日到6月10日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷65万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	96到98天
植物的高度	65到85厘米
豆荚底部离地高度	15到24厘米
千粒重	153.0到156.0克
蛋白质含量	40.0到42.2%
油含量	20.0到20.2%
生产潜力	2.92吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

早熟、高产，种子产量比LIDIA标准大豆品种多出0.12（0.05至0.28）吨/公顷。对细菌性（细菌病）和真菌性（灰星叶点菌）疾病具有综合高抗性，且对褐纹病和根部镰刀菌具有抗性。对于灰斑病和霜霉病感染程度较低，且未出现环纹病菌。对土壤湿度过高具有耐受性以及不易倒伏。在成熟过程中不易裂开。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为1750到1800°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的大豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的形成源于复杂环境条件下的体细胞突变，这并不意味着该品种受到杂质影响，因为带色素的种子与该特定品种的大豆种子具有相同的遗传基础。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”
联邦科学研究所》

LUCHISTAYA



该品种于2023年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”联邦科学研究所》

品种鉴定

植物类型：亚有限结荚型。**植株：**直立型。**茎直立，**长出2到4个长的和短的侧枝，中等短柔毛。**叶片：**具有3片小叶，形状为尖端卵形。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状，茎的中部形成最多3个花序组，花数量：每组有4到12朵花，顶端的花序组有13到17朵花。**豆荚形状**稍微弯曲，偶尔呈直线状，颜色为黄棕色，中等的短毛绒度，通常含有2到3粒豆子。**种子呈黄色，**形状球形，表面光滑；种脐短小、呈椭圆形，其颜色与种子相似。**最佳播种期：**从5月15日到6月01日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷50万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	105到107天
植物的高度	72到85厘米
豆荚底部离地高度	13到15厘米
千粒重	125.0到149.0克
蛋白质含量	38.7到39.0%
油含量	20.2到21.3%
生产潜力	3.13吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

早熟、高产，种子产量比LIDIA标准大豆品种多出0.36（0.20至0.39）吨/公顷。该品种对土壤湿度过高具有耐受性，不易倒伏。其叶片表现出增强的光合活性。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性，对大豆灰星叶点菌病原表现出高度抗性，对细菌病表现出抗性，对褐纹病表现出中度抗性。在研究期间，该品种未受到环纹病菌的侵害。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，既适用于食品，也可用作饲料。建议在远东和西伯利亚的南部、中央和北部土壤气候区进行种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算
科学机构《“全俄罗
斯大豆科学中心”联
邦科学研究所》

APIS



该品种于2022年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”联邦科学研究所》

品种鉴定

植物类型：有限结荚型。**植株：**直立紧凑。**茎**直立，产生1到3个分枝，中等短柔毛，颜色为灰色，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，披针形。**花朵：**白色。**花序形式：**总状。**豆荚**颜色为褐色，形状轻微弯曲，中等绒毛度，种子数量为3、4粒豆子；不易裂开。**种子**呈黄色，形状为圆形或扁圆形，表面光滑；种脐短小，呈线状，与种子颜色一致。**最佳播种期：**从5月20日到6月10日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷60万到65万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	100到104天
植物的高度	62到81厘米
豆荚底部离地高度	12到16厘米
千粒重	146.0到166.0克
蛋白质含量	38.1到40.1%
油含量	19.6到20.2%
生产潜力	3.1吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

早熟、高产，种子产量比LIDIA标准大豆品种多出0.30（0.20至0.39）吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害（如细菌病、环纹病菌、褐纹病、灰斑病、霜霉病、根部镰刀菌）具有综合抗性。对土壤湿度过高具有耐受性，并且相对不易倒伏。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂；湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为1900到2000°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”
联邦科学研究所》

GREY



该品种于2022年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”联邦科学研究所》

品种鉴定

植物类型：有限结荚型。**株型：**紧密型。**茎**产生1到2个分枝，基部无折断，绒毛颜色为灰色。**叶片：**具有3片小叶，狭窄，复叶侧叶的形状为披针形。**花朵：**白色。**花序形式：**总状。**豆荚**颜色为深灰色，形状轻微弯曲，偶尔呈直线状，种子数量为3到4粒，不易裂开，绒毛颜色为灰色。**种子**呈黄绿色，形状球形，表面光滑；种脐短小、黄色，呈椭圆形。**最佳播种期：**从5月15日到5月25日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷50万到55万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	110到112天
植物的高度	76到91厘米
豆荚底部离地高度	14到17厘米
千粒重	140.0到145.0克
蛋白质含量	39.8到40.8%
油含量	19.1到19.4%
生产潜力	3.42吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比DAURIA标准大豆品种多出0.21（0.11至0.40）吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性，对大豆灰星叶点菌和细菌病的病原表现出高度抗性。该品种具有良好的适应性，能够响应外界环境的变化。**种子处理方法：**使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为2200到2300°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”
联邦科学研究所》

VNIIS 18



该品种于2021年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”联邦科学研究所》

品种鉴定

植物类型：有限结荚型。**株型：**直立型、半紧凑型；无折断。**茎**直立，产生1到2个分枝，颜色为橙棕色。**叶片**具有3片小叶，披针形，复叶侧叶的形状为三角形。**花朵：**白色。**花序：**总状。**豆荚**颜色为褐色，形状轻微弯曲，带有深褐色的绒毛，种子数量为4粒（比例达到65%），不易裂开。**种子**呈黄色，形状为圆形近似球状，表面光滑；种脐呈线形、短小、黄色、无芽眼。**最佳播种期：**从5月10日到5月30日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷60万到65万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	108到112天
植物的高度	72到77厘米
豆荚底部离地高度	12到17厘米
千粒重	133.0到145.0克
蛋白质含量	40.1到40.4%
油含量	19.1到20.3%
生产潜力	4.2吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比LIDIA标准大豆品种多出平均0.20吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。对土壤湿度过高具有耐受性。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，既适用于食品，也可用作饲料。建议在年活动积温为2100到2200°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”
联邦科学研究所》

ZOLOTINTZA



该品种于2021年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”联邦科学研究所》

品种鉴定

植物类型：有限结荚型。**植株：**直立型。**茎**产生1到3个紧贴主茎的侧枝。**叶片**具有3片小叶，形状为尖端椭圆形。**花朵：**紫色。**花序：**总状，花序轴的花朵数量为4到12朵花，顶端部有6到12朵花。**种子**呈黄色，形状为扁圆形，表面光泽且有光滑，带有短小的线形的种脐，种脐中间部带有白色芽眼。**豆荚**颜色为褐色，弯镰形，带有黄褐色的短毛绒，通常含有2到3粒豆子。**最佳播种期：**从5月20日到5月30日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷55万到60万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	106到107天
植物的高度	56到63厘米
豆荚底部离地高度	11到14厘米
千粒重	146.0到171.0克
蛋白质含量	37.6到40.4%
油含量	19.7到19.8%
生产潜力	3.22吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

早熟、高产，种子产量比DAURIA标准大豆品种多出0.23（0.14至0.32）吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。对土壤湿度过高具有耐受性，以及不易倒伏。**种子处理方法：**使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为1950到2100℃的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算
科学机构《“全俄罗斯
大豆科学中心”联邦
科学研究所》

TOPAZ



该品种于2020年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”联邦科学研究所》

品种鉴定

植物类型：无限结荚型。**植株：**直立型。**茎**产生3个长分枝和2个短分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，形状为尖端卵形。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状。**种子**呈浅黄色，形状为细长形，表面光滑（偶尔出现皱褶），带有短而窄的黄色种脐；种脐周围呈现深色轮廓，中部带有白色芽眼。**豆荚**颜色为棕色，形状弯曲，带有棕色的短毛绒，含有2粒豆子（30.7%）、3粒豆子（56.7%）和4粒豆子（1.9%）。**最佳播种期：**从5月20日到6月10日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。播种定额：每公顷60万到70万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	89到93天
植物的高度	44到62厘米
豆荚底部离地高度	10到15厘米
千粒重	140.0到177.0克
蛋白质含量	38.9到40.8%
油含量	18.0到20.0%
生产潜力	2.4吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

超级早熟、高产，种子产量比LIDIA标准大豆品种多出平均0.25吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。不易倒伏。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。建议在年活动积温为1700到1800°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”
联邦科学研究所》

CHARODEYKA



该品种于2020年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《“全俄罗斯大豆科学中心”联邦科学研究所》

品种鉴定

植物类型：亚有限结荚型。**植株：**直立型，紧凑型。茎产生2到3条分枝，具备二级分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，形状为尖端卵形。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状，中部茎节的花朵数量为7到11朵，顶端部有12朵花。**种子呈**黄色，形状为圆形近似球状，表面光泽且有光滑，带有短小的、与种子颜色一致的线形的种脐，种脐中间部带有白色芽眼。**豆荚颜色**为褐色，形状稍微弯曲，带有棕色的短毛绒，含有2到3粒豆子，一些个别的豆荚含有4粒豆子。**最佳播种期：**从5月20日到5月31日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷60万到65万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	102到110天
植物的高度	70到88厘米
豆荚底部离地高度	11到15厘米
千粒重	179.0到217.0克
蛋白质含量	38.2到39.9%
油含量	19.0到20.3%
生产潜力	3.19吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

早熟、高产，种子产量比LIDIA标准大豆品种多出平均0.20吨/公顷。对病原微生物和害虫具有抗性。具备较强的适应潜力，属于高效型品种，对栽培条件的改善表现出积极反应。不易倒伏。在研究期间，该大豆品种未受到环纹病菌的侵害。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。建议在年活动积温为1900到2000°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

ZOLUSHKA



该品种于2019年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：亚有限结荚型。**植株：**直立型（紧密型）。茎产生1条长枝、短节间，基部无折断现象。**叶片：**具有3片小叶，狭窄，披针形。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状，茎中部的花朵数量为2个花梗上的花序，花序轴的花数量为13到15朵花，顶端部有16朵花。**种子呈黄色，形状为扁圆形，表面光滑且略有光泽；带有短小的黄色椭圆形种脐。豆荚颜色为灰色，形状轻微弯曲，呈直线状，种子数量3粒（比例为57.4%）和4粒（比例为8.3%），带有灰色的绒毛，中等密度，不易裂开。最佳播种期：**从5月06日到5月20日。播种定额：每公顷40万到50万发芽率高的种子。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**土壤中P₂O₅含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	112到115天
植物的高度	67到70厘米
豆荚底部离地高度	11到17厘米
千粒重	151.0到177.0克
蛋白质含量	37.1到39.3%
油含量	17.8到18.6%
生产潜力	3.3吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比DAURIA标准大豆品种多出0.12至0.55吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性，对褐纹病表现出高度抗性。对于发芽期间的正温度较低情况表现出耐受性，不易倒伏。**种子处理方法：**使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为2250到2350°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

SENTYABRINKA



该品种于2019年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：无限结荚型。**植株：**直立型。**茎**产生1到3个分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶子，狭窄，披针形，尖端。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状，通常每个节点有2个花序，个别植株可达3个花序（每个花序的花朵数量为9到12朵），在花序的顶端有20到24朵花。**种子**呈黄色，表面光滑且略有光泽，形状为长圆形；带有短小的黄色椭圆形种脐，偶尔其颜色比种子稍深。**豆荚**颜色为褐色，形状弯曲，带有橙棕色短毛绒，含有3粒豆子（53.5%）和4粒豆子（20.2%）。**最佳播种期：**从5月20日到6月5日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷60万到65万发芽率高的种子。**土壤中P₂O₅含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	87到99天
植物的高度	52到61厘米
豆荚底部离地高度	9到10厘米
千粒重	132.0到157.0克
蛋白质含量	39.4到42.3%
油含量	17.6到19.2%
生产潜力	3.3吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

早熟、高产，种子产量比LIDIA标准大豆品种多出平均0.15吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。对土壤湿度过高具有耐受性，以及不易倒伏。在伏尔加地区的农业比赛中，经过灌溉试验的31个大豆品种中，SENTYABRINKA大豆品种以44.5%的蛋白质含量成为佼佼者。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。建议在年活动积温为1700到1800°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

STATNAYA



该品种于2019年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：亚有限结荚型。**植株：**直立型。**茎**产生1到2个长的分枝。**叶片：**具有3片小叶，狭窄，尖端披针形。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状，主要为无柄花序，花序中的花朵数量为4到8朵，顶端部有20到25朵花。**种子**呈黄色，表面光滑且略有光泽，形状扁圆形，带有短的黄色椭圆形种脐。**豆荚**颜色为灰色，形状稍微弯曲，凸形，带有灰色短毛绒，含有2粒豆子（16.7%）、3粒豆子（54%）和4粒豆子（24.6%）。**最佳播种期：**从5月20日到6月5日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷60万到65万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	97到103天
植物的高度	69到73厘米
豆荚底部离地高度	11到12厘米
千粒重	109.0到131.0克
蛋白质含量	40.5到42.9%
油含量	17.6到18.3%
生产潜力	2.8吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

早熟、高产，种子产量比LIDIA标准大豆品种多出平均0.40吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。对土壤湿度过高具有耐受性。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。建议在年活动积温为1800到1900°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

ZHURAVUSHKA



该品种于2018年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：有限结荚型。**株型：**直立型，紧密型。**茎**产生2到3个长分枝和1到2个短分枝。**叶片：**具有3片小叶，大而宽，形状为尖锐卵形。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状，每个节点通常有1到3个花序，花序上可有1到2厘米长的花柄。**种子**为黄色，无光泽，长椭圆，带有短的椭圆形的黄色种脐。**豆荚**颜色为褐色，带有浓密的橙棕色的绒毛，毛绒长，形状稍微弯曲，几乎呈直线状。**最佳播种期：**从5月6日到5月15日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷50万到55万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	110到115天
植物的高度	63到78厘米
豆荚底部离地高度	13到20厘米
千粒重	152.0到197.0克
蛋白质含量	36.1到40.9%
油含量	17.5到19.0%
生产潜力	3.3吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比DAURIA标准大豆品种多出0.11至0.37吨/公顷。在早期播种的情况下，产量相较于标准品种高0.43至0.61吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。对于土壤过湿以及发芽期间的正温度较低情况表现出较强的耐受性，不易倒伏。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为2200到2300°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

KRUZHEVNITSA



该品种于2018年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯东西伯利亚地区和远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：无限结荚型。**植株：**直立型，紧凑型。**茎**产生2到6个分枝，基部无折断。**叶片：**具有7片小叶（偶尔有5、8、9片小叶），形状为三角形，尖端。**花朵：**白色。**花序形式：**总状，每个节点通常有2到3个花序，可有长达3.5到5.5厘米的花柄。**种子**为黄色，略带绿色，光泽，形状为扁圆形，表面光滑，带有短小的黄色椭圆形种脐。**豆荚**颜色为带橙色调棕色，形状轻微弯曲，带有表面有浓密的橙棕色的绒毛，每个节位有5到9粒豆子，主要含有3粒种子，偶尔出现含有4粒种子的豆荚，不易裂开。**最佳播种期：**从5月20日到6月5日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷60万到65万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	99到106天
植物的高度	62到68厘米
豆荚底部离地高度	9到12厘米
千粒重	115.0到145.0克
蛋白质含量	38.9到41.2%
油含量	16.9到17.8%
生产潜力	2.9吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

早熟、高产，种子产量比LIDIA标准大豆品种多出0.13至0.21吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。对土壤湿度过高具有耐受性。该品种的叶片表现出增强的光合活性，并具有多叶性和高密度绒毛状覆盖的标记特征，使其在该地区的其他栽培品种中独具特色。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为1900到2000°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

NEVESTA



该品种于2017年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：亚有限结荚型。**植株：**直立型，紧凑型。**茎直立**，产生1到4个分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，披针形（狭窄），尖端。**花朵：**白色。**花序形式：**总状，可有花梗上的花序（1.8到4.7厘米），花序轴的花数量为11到19朵花，顶端部有21到24朵花。**种子呈琥珀色**，表面光滑且有光泽，形状为扁圆形，带有短小的黄色椭圆形种脐。**豆荚**颜色为灰色，带有灰色的绒毛，形状轻微弯曲，不易裂开，种子数量3粒（比例为44.0%）和4粒（比例为38%）。**最佳播种期：**从5月6日到5月15日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷45万到50万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	112到117天
植物的高度	66到77厘米
豆荚底部离地高度	11到24厘米
千粒重	156.0到171.0克
蛋白质含量	39.8到40.7%
油含量	17.1到18.5%
生产潜力	3.7吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比DAURIA标准大豆品种多出0.23至0.35吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性，对根部镰刀菌和大豆灰星叶点菌表现出高度抗性。对于土壤过湿以及发芽期间的正温度较低情况表现出较强的耐受性，**不易倒伏**。建议早期播种。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。建议在年活动积温为2250到2350°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

KUHANNA



该品种于2017年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：有限结荚型。**植株：**直立型。**茎**产生1到3个分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，披针形，狭窄，尖端。**花朵：**白色。**花序形式**总状，花序轴的花朵数量为7到8朵花，顶端部有17到19朵花。**种子**呈黄色，表面光滑且略有光泽，形状为椭圆形，带有中等大小黄色的椭圆形种脐（跟种子同样的颜色）。**豆荚**颜色为带紫色调紫色灰色，形状稍微弯曲，种子数量为4粒（单独植物上的比例可达50%），带有灰色绒毛，可见含1粒种子豆荚（比例较低，仅为2.3%）。**最佳播种期：**从5月7日到5月25日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷45万到50万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 土壤每公斤中的含量**不少于40毫克。

生长期	107到113天
植物的高度	56到63厘米
豆荚底部离地高度	16到21厘米
千粒重	157.0到174.0克
蛋白质含量	40.6到41.9%
油含量	17.0到17.8%
生产潜力	3.5吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比DAURIA标准大豆品种多出0.70（0.40至1.19）吨/公顷，种子蛋白质含量增加3.6%。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。对于发芽期间的正温度较低情况表现出耐受性，不易倒伏。**种子处理方法：**使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为2100到2200°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算
科学机构《全俄罗斯
大豆科学中心》联邦
科学研究所》

LEBIODUSHKA



该品种于2017年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所》

品种鉴定

植物类型：无限结荚型。**植株：**半直立型。**茎**产生1到3个短分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，披针形，狭窄，尖端。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状，每个节点可有花梗上的2个0.5到3厘米长的花序，花序轴的花数量为8到18朵花，顶端部有15到21朵花。**种子**呈黄色，表面光滑且略有光泽，形状为长圆形，带有中等大小黄色的椭圆形种脐（跟种子同样的颜色）。**豆荚**颜色为灰色，形状稍微弯曲，通常种子数量为3、4粒，带有灰色的绒毛。**最佳播种期：**从5月6日到5月25日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷40万到50万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	109到115天
植物的高度	74到77厘米
豆荚底部离地高度	14到21厘米
千粒重	130.0到140.0克
蛋白质含量	39.4到39.7%
油含量	17.9到19.4%
生产潜力	3.5吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比DAURIA标准大豆品种多出0.12至0.71吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。对于土壤过湿以及发芽期间的正温度较低情况表现出较强的耐受性，不易倒伏。**种子处理方法：**使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为2200到2300°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

KITROSSA



该品种于2016年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：亚有限结荚型。**植株：**直立型。**茎**产生无限数量的多条分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，披针形，狭窄，尖端。**花朵：**白色。**花序形式：**总状。**种子**呈琥珀色，形状为球形，表面光滑，且无光泽，带有短小的黄色线状种脐。**豆荚**颜色为灰色，形状轻微弯曲，顶部轻微拉长，不易开裂，种子数量为2粒（比例为5.4%）、3粒（比例为49.4%）、4粒（比例为45.2%），表面带有灰褐色的绒毛。**最佳播种期：**从5月10日到5月25日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷45万到50万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	113到114天
植物的高度	71到97厘米
豆荚底部离地高度	15到22厘米
千粒重	145.0到186.0克
蛋白质含量	37.9到39.9%
油含量	17.4到18.7%
生产潜力	4.0吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比DAURIA标准大豆品种多出0.27吨/公顷，种子蛋白质含量增加2.0%。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。**不易倒伏。**种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为2250到2350°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所》

PEPELINA



品种鉴定

该品种于2016年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所》

生长期	104到110天
植物的高度	59到68厘米
豆荚底部离地高度	12到20厘米
千粒重	120.0到154.0克
蛋白质含量	37.6到40.6%
油含量	17.6到18.0%
生产潜力	3.4吨/公顷

植物类型：有限结荚型。**植株：**直立型、半紧凑型。茎产生1到3个分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，三角形，狭窄，尖端。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状，一个节点上可有2个花序，顶端部有10到20朵花。**种子呈黄色**，形状为扁圆形，表面光泽且有光滑，带有短小的浅褐色椭圆形种脐。**豆荚颜色为灰色**，形状轻微弯曲，不易裂开，种子数量为3粒（比例为57%）、4粒（比例为3.9%）。**最佳播种期：**从5月15日到5月30日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷45万到50万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比DAURIA标准大豆品种多出0.50（0.24至0.76）吨/公顷，种子蛋白质含量增加2.3%。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。对土壤湿度过高具有耐受性，不易倒伏。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。建议在年活动积温为2000到2100°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

UMKA



品种鉴定

该品种于2015年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

生长期	104到110天
植物的高度	65到95厘米
豆荚底部离地高度	13到17厘米
千粒重	170.0到198.0克
蛋白质含量	38.3到41.1%
油含量	22.6到22.8%
生产潜力	3.8吨/公顷

植物类型：亚有限结荚型。**植株：**直立型或半直立型。**茎**产生分枝的数量：无限，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，宽型，形状为尖锐卵形。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状，花冠颜色为紫色。**种子**呈黄色，形状为球形，带有短小的颜色与种子一致的椭圆形种脐。**豆荚**颜色为褐色，形状轻微弯曲，带有灰色的绒毛，植物过熟不易裂开。**最佳播种期：**从5月20日到5月30日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷45万到55万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比LIDIA标准大豆品种多出0.25吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。不易倒伏。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。建议在年活动积温为2000到2100°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

ALIONA



品种鉴定

该品种于2014年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

植物类型：无限结荚型。**植株：**直立型。**茎**直立，产生无限数量的多条分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，披针形。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状。**种子**呈黄色，形状为球形，表面光滑且略有光泽，种脐呈小短、椭圆形、黄色。**豆荚**颜色为灰色，带有浅灰色的绒毛，种子数量为2至4粒（含有4粒种子的豆荚比例为40%）；不易裂开。**最佳播种期：**从5月6日到5月25日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷40万到50万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	115到125天
植物的高度	85到110厘米
豆荚底部离地高度	18到32厘米
千粒重	152.0到200.0克
蛋白质含量	38.1到42.0%
油含量	18.0到19.8%
生产潜力	3.9吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

晚熟、高产，种子产量比DAURIA标准大豆品种多出0.23（0.14至0.32）吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。对于土壤过湿以及发芽期间的正温度较低情况表现出较强的耐受性。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为2300到2400°C的地区种植。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂；湿润年份使用杀真菌剂。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

BONUS



该品种于2014年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：有限结荚型。**植株：**直立型、产生少量分枝。**茎直立**，具有灰色绒毛，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，椭圆形，大型。**花朵：**白色。**花序形式：**总状。**豆荚颜色**为浅褐色，形状轻微弯曲，带有浅灰色的绒毛，种子数量为2、3、4粒（含有3粒种子的豆荚比例为60%），不易裂开。**种子呈黄色**，形状为圆形，中等大小，表面光滑且略有光泽，带有小短的椭圆形黄色调种脐。**最佳播种期：**从5月10日到5月25日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷40万到50万发芽率高的种子。**土壤中P₂O₅含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	112到118天
植物的高度	65到75厘米
豆荚底部离地高度	14到18厘米
千粒重	175.0到204.0克
蛋白质含量	38.4到41.6%
油含量	18.6到19.2%
生产潜力	3.7吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

晚熟、高产，种子产量比DAURIA标准大豆品种多出0.24（0.12至0.29）吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性，对根部镰刀菌和大豆灰星叶点菌表现出高度抗性。对土壤湿度过高具有耐受性，以及不易倒伏。

种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为2300到2400°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

EVGENIA



该品种于2014年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：亚有限结荚型。**植株：**半紧凑型。**茎**产生2到4个分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，形状为尖端卵形。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状。**种子**呈黄色、光泽，形状为球形扁平，带有中等大小的椭圆形种脐，种脐颜色与种子一致；种子表面光滑，在某些年份可出现轻微的皱褶。**豆荚**颜色为灰色，形状轻微弯曲，不易裂开，种子数量为2、3粒。**最佳播种期：**从5月7日到5月25日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷40万到45万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	107到121天
植物的高度	67到78厘米
豆荚底部离地高度	14到19厘米
千粒重	177.0到197.0克
蛋白质含量	38.1到39.7%
油含量	17.9到18.4%
生产潜力	3.3吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比GARMONIA标准大豆品种多出0.57（0.44到0.65）吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性，对根部镰刀菌和大豆灰星叶点菌表现出高度抗性。对于土壤过湿以及发芽期间的正温度较低情况表现出较强的耐受性，不易倒伏。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，既适用于食品，也可用作饲料。建议在年活动积温为2100到2200°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算
科学机构《全俄罗斯
大豆科学中心》联邦科学研究所

NEGA 1



该品种于2013年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：无限结荚型。**植株：**紧凑型。**茎**产生1到3个分枝，基部无折断，具有橙棕色绒毛。**叶片：**具有3片小叶，形状为尖锐宽卵形，中等大小，边缘完整。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状（有7到12朵花），一个节点上可有2个花序。**种子**呈深黄色，形状为椭圆形，表面光滑且略有光泽，带有中等大小的颜色与种子一致的椭圆形种脐。**豆荚**颜色为浅褐色，形状轻微弯曲，接近直线状，顶部尖锐，可见4粒。**最佳播种期：**从5月7日到5月30日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷47万到50万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	110到116天
植物的高度	70到93厘米
豆荚底部离地高度	15到23厘米
千粒重	157.0到183.0克
蛋白质含量	38.6到39.6%
油含量	19.0到20.3%
生产潜力	3.4吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比OKTYABR70标准大豆品种多出0.22（0.11到0.31）吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。对于发芽期间的正温度较低情况表现出耐受性。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。建议在年活动积温为2200到2300°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所》

PERSONA



该品种于2013年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯东西伯利亚地区和远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所》

品种鉴定

植物类型：有限结荚型。**株型：**紧密型。**茎**产生1到3条分枝，具备二级分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，披针形，颜色为深绿色。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状，其特点是带有17到25朵花的出色的多花顶端花序。**种子**呈黄色，表面光滑且略有光泽，形状为长圆形或球形，带有中等大小的黄色椭圆形种脐。**豆荚**颜色为灰色，带有浅色绒毛，形状轻微弯曲，尖形的，种子数量为2到3、4粒。**最佳播种期：**从5月20日到5月31日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷50万到60万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	103到109天
植物的高度	61到98厘米
豆荚底部离地高度	9到14厘米
千粒重	110.0到139.0克
蛋白质含量	38.0到43.0%
油含量	18.0到19.1%
生产潜力	3.2吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，比GARMONIA标准大豆品种多出平均0.28公担/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。对土壤湿度过高具有耐受性，不易倒伏。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在远东和的南部和中央土壤气候区进行种植。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。建议在年活动积温为1900到2000°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

MK 100



该品种于2011年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：亚有限结荚型。**植株：**直立型，紧凑型。**茎**产生1到3个分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，披针形近似三角形，尖端。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状，一个花序有10朵花，一个节点上可有2个花序。**种子**呈黄色，形状为球形，表面光泽、光滑；带有中等大小的褐色椭圆形种脐。**豆荚**颜色为褐色，中等弯曲，尖形的顶部，橙棕色短毛，种子数量为2到3，可见4粒。**最佳播种期：**从5月10日到5月30日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷45万到55万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	104到116天
植物的高度	57到92厘米
豆荚底部离地高度	14到20厘米
千粒重	122.0到164.0克
蛋白质含量	37.8到38.9%
油含量	18.0到20.9%
生产潜力	3.9吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比GARMONIA标准大豆品种多出0.25到0.44吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。适应性强，对干旱和过湿的反应轻微。用于粮食生产，适用于食品、饲料用途。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。建议在年活动积温为2200到2300°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

GRAZIA



该品种于2010年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯东西伯利亚地区和远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：亚有限结荚型。**株型：**紧密型。**茎**产生最多2个分枝，基部无折断，节间短，节点上的豆荚数量更多。**叶片：**具有3片小叶，宽卵形。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状。**种子**呈黄色，表面光滑，形状为扁圆形，带有短小的、与种子颜色一致的椭圆形种脐。**豆荚**颜色为浅褐色，形状轻微弯曲，尖形的顶端，带有橙棕色的绒毛，种子数量为2到3粒，少量荚含4粒种子；不易裂开。**最佳播种期：**从5月20日到6月5日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷60万到65万发芽率高的种子。**土壤中P₂O₅含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	90到97天
植物的高度	50到80厘米
豆荚底部离地高度	11到13厘米
千粒重	121.0到160.0克
蛋白质含量	38.8到39.8%
油含量	20.3到21.5%
生产潜力	3.3吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

早熟、高产，种子产量比LIDIA标准大豆品种多出0.13至0.23吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性，对根部镰刀菌和大豆灰星叶点菌表现出高度抗性，对褐纹病和细菌病表现出中度抗性。**不易倒伏。**种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为1800到1900°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

LAZURNAYA



该品种于2009年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：无限结荚型。**植株：**半紧凑型。**茎**产生2到4个分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，宽椭圆形且尖端锐利。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状（有5到12朵花），下部每个节点上可有2个花序。**种子**呈黄色，具有亚光的色泽，偶尔显示出轻微的光泽，形状为圆形，表面光滑；种脐与种子颜色一致，偶尔带有淡粉色，形状为线形（短而窄）。**豆荚**颜色为棕褐色，轻微弯曲，尖端锐利，茎部有浅灰色短毛绒，种子数量为2至3粒，均匀分布于整株植物。**最佳播种期：**从5月15日到5月30日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷45万到50万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	104到116天
植物的高度	60到90厘米
豆荚底部离地高度	13到18厘米
千粒重	163.0到203.0克
蛋白质含量	38.7到41.4%
油含量	19.4到20.9%
生产潜力	3.6吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比OKTYABR70标准大豆品种多出0.19（0.03到0.39）吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。不易倒伏。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为2100到2200°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

LIDIA



该品种于2005年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯东西伯利亚地区和远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

品种鉴定

植物类型：无限结荚型。**株型：**中间型（中等紧密型）。**茎**具有直立的端部，产生2到5个分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，形状为尖端卵形。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状（3到5朵花）。**种子**呈黄色，表面光滑且略有光泽，形状为椭圆形或扁平椭圆形；带有宽椭圆形的棕色种脐，其轮廓模糊，中间部分呈芽眼形状。**豆荚**颜色为浅褐色，形状轻微弯曲，尖端明显尖锐，带有橙棕色的绒毛，成熟过程均匀，不易破裂，种子数量为2至3粒。**最佳播种期：**从5月20日到6月5日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷65万到70万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	96到104天
植物的高度	57到90厘米
豆荚底部离地高度	13到18厘米
千粒重	158.0到168.0克
蛋白质含量	39.3到41.1%
油含量	20.6到21.8%
生产潜力	3.1吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

早熟、高产，种子产量比SMENA标准大豆品种多出0.26至0.39吨/公顷，蛋白质含量高1.8%。对褐纹病表现出中度抗性。不易倒伏。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。建议在年活动积温为1800到1900°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

GARMONIA



该品种于2003年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯中伏尔加地区和远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所。

品种鉴定

植物类型：无限结荚型。**株型：**中等紧密型。**茎**具有直立的端部，顶端部的充实度为中等，产生3到5个分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，狭窄，形状为矛状。**花朵：**白色。**花序形式：**总状（最多生长8朵花）。**豆荚**颜色为褐色，带有橙棕色的绒毛，形状轻微弯曲，尖形的顶端部，种子数量为2、3、4粒，不易裂开。**种子**呈黄色，偶尔略带绿色，表面略有光泽，形状为圆形或椭圆形；带有中等大小的椭圆形种脐，种脐颜色与种子相似，偶尔更深。**最佳播种期：**从5月15日到5月30日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷45万到55万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	102到107天
植物的高度	65到95厘米
豆荚底部离地高度	13到16厘米
千粒重	154.0到181.0克
蛋白质含量	37.5到39.6%
油含量	19.3到22.0%
生产潜力	3.8吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比VNIIS1标准大豆品种多出0.29（0.11到0.43）吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。建议在年活动积温为1900到2000°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

DAURIA



品种鉴定

该品种于2003年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯远东地区使用；育种者：俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》联邦科学研究所

植物类型：无限结荚型。**株型：**紧密型。**茎直立，**顶端部充实度高，产生1到4个分枝，基部无折断。**叶片：**具有3片小叶，卵形，成熟后掉落。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状（4到9朵花）。**种子呈黄色，**具有亚光色调，形状为圆形近似球状，种脐与种子颜色一致，底部有一个暗点，偶尔会变成模糊的棕色斑点。**豆荚颜色为灰色，**带有浅色绒毛，形状轻微弯曲，尖形的，种子数量为2、3、4粒。**最佳播种期：**从5月15日到5月30日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**播种定额：**每公顷48万到52万发芽率高的种子。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	104到110天
植物的高度	50到100厘米
豆荚底部离地高度	15到18厘米
千粒重	182.0到214.0克
蛋白质含量	37.3到40.3%
油含量	19.9到21.9%
生产潜力	3.6吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

中熟、高产，种子产量比OKTYABR70标准大豆品种多出0.36（0.15到0.33）吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。不易倒伏。种子处理方法：使用微生物肥料配铝酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。用于粮食生产，既适用于食品，也可用作饲料。建议在年活动积温为2000到2100°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》
联邦科学研究所

SONATA



该品种于1998年列入俄罗斯联邦国家育种成果登记册，供俄罗斯中伏尔加地区和远东地区使用；**育种者：**俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄罗斯大豆科学中心》**联邦科学研究所**

品种鉴定

植物类型：亚有限结荚型。**株型：**形状为半紧凑型，紧凑型。**茎**产生的分枝数量少，生长高度中等。**叶片：**具有3片小叶，颜色为绿色，形状为尖端卵形。**花朵：**紫色。**花序形式：**总状（花序较短），有2到8朵花。**豆荚**颜色为浅褐色，带有黄色调橙棕色短毛绒，形状稍微弯曲，含有2到3粒豆子。**种子**呈浅黄色，形状为圆形和椭圆形，表面光滑，无明显的色素；种脐中等，其形状为线状且略呈椭圆，颜色与种子一致，底部有微弱的点状特征。**播种定额：**每公顷60万到65万发芽率高的种子（不包括耙地）。**最佳播种期：**从5月20日到5月31日。**播种方式：**窄行条播，宽行条播。**土壤中 P_2O_5 含量：**不少于40毫克/千克土壤。

生长期	91到99天
植物的高度	62到83厘米
豆荚底部离地高度	14到18厘米
千粒重	126.0到156.0克
	38.8到40.9%
油含量	20.0到20.7%
生产潜力	3.1吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

早熟、高产，种子产量比SMENA标准大豆品种多出0.15到0.25吨/公顷。对大豆的真菌和细菌病害具有综合抗性。对机械化耕作的适应性良好。用于粮食生产，适用于食品和饲料用途。种子处理方法：使用微生物肥料配钼酸铵溶液、生物预防剂，湿润年份使用杀真菌剂。建议在年活动积温为1900到2000°C的地区种植。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄大豆科学中心》联邦科学研究中心

SEMENYCH



该品种于2025年已列入俄罗斯联邦国家育种成果名录，适用于远东地区中。发明家为《全俄大豆研究所》联邦国家预算科学机构的联邦科学中心。

品种鉴定

该品种的特点为亚有限结荚型，灌木形状为直立的。大豆秆为直的，可形成1至4条长与短枝。叶子为宽大，具有尖卵形，3叶，全缘叶的。花序为总状花序，每茎中部上着生2朵花总状花序，秆中部节上有5至17朵花，顶总状花序上有13至18朵紫色花。豆荚形状为直立的，有棕色。豆荚与茎秆的绒毛程度中等，颜色为火红色的。豆子有黄色，椭圆形，表面光滑。种脐为短而椭圆形，颜色与豆子一样，有时颜色会略深一些。

生长期	94到103天
植物的高度	73到95厘米
豆荚底部离地高度	15到17厘米
千粒重	138.0到168.0克
蛋白质含量	39.5到43.7%
油含量	19.8到22.1%
生产潜力	3.12吨/公顷

该品种相较于知名品种的优势

SEMENYCH品种对细菌病 (*Bacterium glycineum* Coerper)、褐斑病 (*Phyllosticta soyaecola* Macc)、根腐病根腐 (*Fusarium*)、喙孢霉叶枯病 (*Septoria glycines* Hemmi) 及尾孢菌病 (*Cercospora kikuhii*) 具有很强的抵抗力。霜霉病 (*Perenospora manchurika*) 的感染力较弱。

这是一个早熟、技术先进的品种，其专注于稳定的经济成果。该品种比标准LIDIA品种平均每公顷产量高出0.19吨，种子蛋白质含量高出4.2%。此外，该品种单位面积粗蛋白产量为0.14吨/公顷，比LIDIA品种的类型产量高20.9%，使该品种的盈利能力提高了15%至20%。生长周期短，蛋白质及脂肪含量高的配合，这使得可控生产模式成为可能，并能提高作物利润率。这种品种的植物结构可保证其抗倒伏能力及机械收割的工艺性。该品种兼具商业产量及高蛋白含量，从而可提高其在饲料及加工领域的价值。该品种对大豆病虫害具有全面的抗性，并且在发芽期及初期生长阶段具有较强的抗旱性。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄大豆科学中心》联邦科学研究所

ALMAGA



该品种于2026年已列入俄罗斯联邦国家育种成果名录，适用于远东地区中。发明家为《全俄大豆研究所》联邦国家预算科学机构的联邦科学中心。

品种鉴定

该品种的特点为亚有限结荚型，主茎顶部为良好的发育，灌木形状为直立的。

生长期	110到116天
植物的高度	75到85厘米
豆荚底部离地高度	13到22厘米
千粒重	156.0到170.0克
蛋白质含量	39.1到43.4%
油含量	17.8到19.2%
生产潜力	3.49吨/公顷

大豆秆为直的，可形成1至2条长与短枝。叶子为披针形，3叶，全缘叶，叶尖为尖形的。花序为总状花序，茎中部节间通常有2朵花总状花序。花梗为中等大小，2.1（1.5至2.5厘米）。每个节上含有7至12朵花，顶端总状花序上含有18至25朵花。

大豆花为大型（0.9厘米），紫色的（旗瓣颜色为鲜紫、翼瓣与龙骨瓣为浅紫色的）。豆荚为略微弯曲的形状，有两端尖，两半豌豆荚颜色为灰色的，绒毛程度为中等的。豆荚主要有2粒豆子或3粒豆子，1粒豆子的占10.6%；2粒豆子的占27.3%；3粒豆子的占47.0%；4粒豆子的占15.1%。豆子有黄色，圆形，近乎球形，表面光滑。种脐为短而椭圆形，颜色与豆子一样，有时颜色会略深一些。

该品种相较于知名品种的优势

这是一种中熟、技术先进、集约化、灵活的大豆品种。该品种比标准DAURIA品种平均每公顷产量高出0.20吨，种子蛋白质含量高2.8%。豆荚有2粒豆子、3粒豆子或4粒豆子。这种大豆品种耐旱，其豆子能够在土壤水分不足的情况下发芽，并在生长发育后期承受脱水胁迫。这种大豆蛋白质含量高，因此在饲料及食品领域均极具吸引力。该品种的特点是适应性强，抗倒伏，且对病原体具有全面的抵抗力。ALMAGA大豆品种植物对细菌病(*Bacterium glycineum* Coerper)，尾孢菌病(*Cercospora kikuhii*)、褐斑病(*Phyllosticta soyaecola* Macc)具有很强的抵抗力；对喙孢霉叶枯病(*Septoria glycines* Hemmi)有抵抗力。霜霉病(*Perenospora manchurika*的感染力)较弱。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志性特征。



俄罗斯联邦国家预算科学机构《全俄大豆科学中心》联邦科学研究中心

DYMKA



品种鉴定

该品种于2026年已列入俄罗斯联邦国家育种成果名录，适用于12地区中。发明家为《全俄大豆研究所》联邦国家预算科学机构的联邦科学中心。

生长期	109到117天
植物的高度	82到96厘米
豆荚底部离地高度	15到22厘米
千粒重	196.0到219.0克
蛋白质含量	39.1到39.9%
油含量	18.4到19.3%
生产潜力	3.72吨/公顷

该品种的特点为亚有限结荚型，主茎顶部为良好的发育，灌木形状为直立的。大豆秆为直的，可形成1至3条长与短枝。

叶片为3片小叶，形状宽卵形，一端尖。花序为总状花序，花梗很短—0.95厘米（0.65至1.61），茎中部节上着生1-2个花序，一个节上着生5—18朵花，顶生花序着生16—20朵花，花为紫色。

豆荚均有略微弯曲形状，淡棕色。豆荚及茎秆的绒毛程度中等，颜色为灰色。豆荚主要为2—3粒豆子，其中1粒豆子占9.5%；2粒豆子占28.6%；3粒豆子占45.3%；4粒豆子占16.6%。豆子有黄色，椭圆形，表面光滑。种脐为短而椭圆形。

该品种对致病病原体具有复杂的抗性，并且相对不易倒伏。最佳播种期为5月10日至25日。播种方式：宽行播种、窄行播种。播种量为每1公顷50万至55万粒可发芽种子。

该品种相较于知名品种的优势

该品种为中季高产品种，平均每公顷产量比标准DAURIA品种高0.36吨，具有高度稳定性和对区域条件的适应性。豆荚有2粒豆子、3粒豆子或4粒豆子。该品种的特点为高产量。该品种对致病病原体及大豆害虫具有全面的抵抗力。该大豆品种植物对细菌病(*Bacterium glycineum* Coerper)，霜霉病

(*Perenospora manchurika*)、尾孢菌病(*Cercospora kikuhii*)、褐斑病(*Phyllosticta soyaecola* Macc)具有很强的抵抗力；对喙孢霉叶枯病(*Septoria glycines* Hemmi)及根腐病根腐(*Fusarium*)有抵抗力，对喙孢霉叶枯病(*Septoria glycines* Hemmi)有高抗性。对霜霉病(*Perenospora manchurika*)有抗性。在多年的研究中，该品种并未受到大豆环纹病菌(*Ascochyta sojaecola* Abramov)的病害。

在气候条件不利的年份（如过度湿润、干旱等）繁殖该品种的黄豆种子时，可能会在播种中出现典型的带有不同强度棕色（褐色）种子的植物。色素的变化不影响种子的其他形态特征，亦不作为品种的标志特征。

俄罗斯联邦国家预算科学机构《**全俄罗斯大豆科学中心**联邦科学研究所》



阿穆尔州，布拉戈维申斯克市，
伊格纳季耶夫斯科耶公路，
19号，邮编：675028



8 (4162) 36 94 50
(接待厅)



info@vniisoi.ru



<http://вниисои.рф>



<http://t.me/vniisoi>



<https://vk.com/vniisoi>

种子销售部



8 (914) 551 00 30



全俄大豆科学研究所是一
门为国家工作的科学!